

CBM 8 MV

[[Zpět](#)]

Název	CBM 8 MV
Skupina	18 - insekticid ● Obdělníkový výstřezek
Číslo stanoviska	13/2015
Držitel rozhodnutí	INTERHYGIENE, GmbH Cuxhaven, Německo,
Výrobce	INTERHYGIENE, GmbH Cuxhaven, Německo,
Složení	18 mg/g Abamectin CAS 71751-41-2 (směs Avermectin B1a, > 80%, EINECS 265-610-3, a Avermectin B1b, < 20%, EINECS 265-611-9)
Popis přípravku	hnědá kapalina, nasládlého zápachu, pH 4 – 7.
Balení	500 ml
Užití	CBM 8 MV je účinný proti červenému drůbežimu roztoči, prachovému roztoči, čmelíkům, péřovým vším, blechám a jiným ektoparazitům. Má spolehlivý, rychlý a vytrvalý reziduální účinek. Přípravek se může při správném použití aplikovat v přítomnosti zvířat. Oblast účinnosti: Stáje drůbeže, prasat, skotu, koní, ovcí a koz, stodoly, stavební sloupky atd. 500 ml přípravku je dostačující na 1000m ² .
Způsob použití	Důkladně vyčistit stáje. Pracovní roztok nanášíme vhodným vysokotlakým zařízením. Zejména na podlahy, ale i stěny, stropy, příslušenství a vybavení. Dávkování: CBM 8 MV při těžkém napadení 0,5% (50 ml/10 litrů vody); při nízkém napadení 0,25% (25 ml/10 litrů vody). 10 litrů pracovního roztoku stačí na cca 100 m ² oblasti. Protřepejte lahvičku před použitím. Připravte roztok a promíchejte. Pracovním roztokem postříkejte stodoly a stabilní zařízení, v závislosti na zamoření. Chcete-li dosáhnout dlouhodobý efekt při velmi těžkém zamoření, používejte 1% koncentraci. Je důležité dostat přípravek do všech trhlin a štěrbin, postřik opakujte jednou nebo dvakrát za 7 dní léčby.
Bezpečnost práce	Bezpečnostní opatření pro práci jsou uvedeny na etiketě.
Upozornění	Pro dezinfekci a řešení roztočů a roztočů vajec v prázdné stáji, doporučujeme přípravek Interkokask. Nestříkejte na krmivo. Položená vejce, krmné a napájecí žlaby musí být zakryty.
Způsob skladování	Lahvičky správně dopravujte a skladujte. Chraňte před mrazem. Obaly nesmí být znovu zdné obaly odevzdejte na recyklaci.
Doba použitelnosti	5 let