

## DEADYNA®

DEADYNA®

*Přípravek je určen k profesionálnímu použití*

*Biocidní přípravek: insekticid, TP 18*

*Účinné látky: 100 g přípravku obsahuje*

*Cypermethrin čistý (cis/trans 40/60) 6,85 g (69,2 g/l)  
(technický 7,61 g)*

*Tetramethrin čistý 1,25 g (12,6 g/l)  
(technický 1,36 g)*

*Ko-formulanty do 100 g*

**OBSAHUJE: kalcium dodecylbenzen sulfonát, lineární**

### OZNAČENÍ RIZIK:

H318 Způsobuje vážné poškození očí. H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

### PREVENTIVNÍ OPATŘENÍ:

P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí. P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.

P391 Uniklý produkt seberte. P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. P501 Odstraňte obsah/obal jako nebezpečný odpad.

NEBEZPEČÍ



### OZNAMOVATEL:

**BLEU LINE S.r.l.** Via Virgilio, 28 - Z.I. Villanova - 47122 Forlì (FC) – Itálie  
Tel (+39) 0543 754430

### VÝROBCE:

**FERBI S.r.l.** – viale 1°Maggio C.da Ripoli – 64023 Mosciano S.Angelo (TE), Itálie  
**SELECTA S.r.l.** Via Tacito, 9 - 20094 Corsico (MI), Itálie

### DOVOZCE A DISTRIBUTOR V ČR:

**SLOM, s.r.o.**, Staromlýnská 47, 760 01 Zlín – Příluky  
Tel./fax: +420 577 218 701, email: slom@slom.cz, www.slom.cz

**Číslo povolení:** .....

**BALENÍ: 1-10 L**

## CHARAKTERISTIKA

Insekticidní koncentrát ve formě vodní mikroemulze, určený k naředění vodou a k aplikaci postřikem proti širokému spektru škodlivého létajícímu hmyzu, jako jsou mouchy, komáři, pakomáři, vosy, zavíječi, tiplici a muchničky, a lezoucímu hmyzu jako jsou rusi, švábi, mravenci, rybenky, pavouci, brouci, blechy, apod. v bytech, školách, veřejných budovách, úřadech, rekreačních objektech, hotelích, ubytovnách

zařízeních, restauracích, provozovnách veřejného stravování, zdravotnických zařízeních, potravinářských výrobnách a provozovnách, v průmyslových provozovnách, v objektech živočišné výroby, v objektech chovů zvířat, v prostředcích veřejné dopravy a pro hubení dospělých komárů v okolí obytných budov pod.

## UPOZORNĚNÍ:

Chraňte před dětmi a nepoučenými osobami. Uchovávejte mimo dosah domácích zvířat. Při nakládání s přípravkem a při jeho aplikaci zabraňte kontaminaci potravin, nápojů a krmiv a jejich obalů. Nepoužívejte v koncentrovaném stavu. Používejte podle návodu k použití a v doporučeném dávkování. Zabraňte kontaminaci kůže. Zabraňte kontaminaci očí a při aplikaci nevdechujte aerosol přípravku. Vstup do ošetřených prostorů, zejména obytných místností a pracovních prostorů, je povolen až po zaschnutí ošetřených povrchů a důkladném odvětrání. Po skončení práce s přípravkem a při kontaminaci kůže se dobře umyjte vodou a mýdlem. Nepoužívejte ve volné přírodě. Neaplikujte na lidi a na domácí zvířata. Nepoužívejte za přítomnosti zvířat.

Nepoužívejte k ochraně rostlin. Neaplikujte na rostliny určené ke konzumaci lidí nebo domácích zvířat.

Přípravek je možné podávat jen v neporušených originálních obalech. Prázdné obaly přípravku nelze používat k jiným účelům.

## MECHANISMUS ÚČINNOSTI:

Přípravek DEADYNA® je vodní mikrosuspenzí obsahující kombinaci dvou syntetických pyretroidů, cypermethrinu a tetramethrinu, které působí kontaktně a zajišťují rychlou a dlouhodobou smrtící účinnost postřiků.

## NÁVOD NA POUŽITÍ:

Přípravek DEADYNA® naředte vodou a aplikujte postřikem na všechna místa výskytu a do všech úkrytů hmyzu, za použití standardních typů ručních tlakových nebo motorových postřikovačů, v dávce 1 litr na 10 - 15 m<sup>2</sup> ošetřené plochy při následujícím ředění:

### Létající hmyz:

**Ve vnitřním prostoru:** přípravek naředte na 0,5-1% směs (tj. 50-100 ml přípravku do 10 litrů vody) a aplikujte na všechny povrchy, na které hmyz sedá a v noci nebo ve dne odpočívá (stěny, strop, žaluzie apod.). Vyšší koncentrace je doporučena pro hubení much.

**V okolí budov:** přípravek naředte na 0,5-1% směs (tj. 50-100 ml přípravku do 10 litrů vody) a aplikujte na vnější stěny budov nebo na vegetaci, ve které se přes den ukrývají komáři. V tom případě aplikujte takové množství přípravku, aby z vegetace neokapával.

### Lezoucí hmyz:

**Ve vnitřním prostoru:** přípravek naředte na 0,5-1% směs (tj. 50-100 ml přípravku do 10 litrů vody) a aplikujte na všechna místa výskytu a do všech úkrytů hmyzu (do štěrbin a prasklin, za lišty a obložení stěn apod.). Vyšší dávka je doporučena proti rusům a švábům.

**V okolí budov:** přípravek naředte na 0,5-1% směs (tj. 50-100 ml přípravku do 10 litrů vody) a aplikujte na vnější stěny budov, chodníky apod.

Přípravek DEADYNA® může být naředěn vodou na 3-5% směs (tj. 3000-5000 ml přípravku do 100 litrů vody) a aplikován ve formě studeného nebo horkého aerosolu v dávkách 0,5-1 litr na 1 ha nebo 0,5-2 litry na každých 1000 m<sup>3</sup> vnitřního prostoru.

## UPOZORNĚNÍ:

Naředěný přípravek spotřebujte během dne jeho přípravy.

V potravinářských provozovnách i v jiných typech prostor odstraňte před postřikem potraviny, nápoje a krmiva, nebo je zajistěte, aby nebyly postřikem přímo zasaženy. Při aplikaci postřiku v objektech živočišné výroby a chovu zvířat provádějte postřik bez přítomnosti zvířat a zvířata vraťte až po úplném zaschnutí postřiku. Postřik opakujte v intervalech 15-20 dní nebo v kratších intervalech v případě, že se škůdci znovu objeví dříve.

Přípravek DEADYNA® nepoškozuje ošetřené povrchy. V případě pochybností vyzkoušejte nejdříve postřik na malé, nenápadné ploše.

Výrobce ani distributor není zodpovědný za škody způsobené nesprávným použitím přípravku. Za tyto případné škody zodpovídá uživatel.

## PRVNÍ POMOC:

### Informace pro lékaře:

**Pharmakodynamika účinných látek:** přerušují přenos nervových impulzů. **Terapie:** Symptomatická.

- Při vdechnutí: Postiženého přemístěte na čerstvý vzduch, uvolněte těsný oděv, udržujte v klidu a teple. Zajistěte lékařské ošetření, pokud potíže přetrvávají.
- Při kontaminaci kůže: Odstraňte kontaminovaný oděv, postižené místo kůže omyjte velkým množstvím vody a pak omyjte mýdlem a vodou.
- Při zasažení očí: Zasažené oko/oči vyplachujte několik minut velkým množstvím vody, vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno a pokračujte ve vyplachování. Vyhledejte očního lékaře, pokud jakékoliv potíže přetrvávají.
- Při požití: Nevyvolávejte zvracení. Je-li postižený při vědomí, vypláchněte ústa vodou.

Oděv kontaminovaný přípravkem může být vyprán normálním způsobem. Při poskytování první pomoci není ochranný oděv a pomůcky nutný.

V případě potřeby kontaktujte Toxikologické informační středisko, Klinika nemocí z povolání,

Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2 Telefon 24 hod. denně: 2 2491 9293, 2 2491 5402, 2 2491 4575,  
e-mail: tis@.cesnet.cz

## **SKLADOVÁNÍ:**

Skladujte v originálních neporušených uzavřených obalech, v suchém, čistém, dobře větratelném a uzavřeném skladu, při teplotě vyšší než + 5°C, odděleně od potravin, léků, krmiv, dezinfekčních prostředků a obalů od těchto látek.

## **LIKVIDACE OBALŮ A ZBYTKŮ PŘÍPRAVKU:**

Přípravkem kontaminované obaly a zbytky přípravku skladujte a likvidujte jako nebezpečný odpad.

## **DOBA POUŽITELNOSTI:**

Spotřebujte do 2 roků od data výroby uvedeném na obalu.

**ČÍSLO ŠARŽE:..... DATUM VÝROBY:.....**