

Ficam[®] 80 WP

Biocidní přípravek pro profesionální použití ve formě smáčitelného prášku proti škodlivému a obtížnému hmyzu.

Účinná látka: bendiokarb 800 g/kg

Nebezpečné látky v přípravku: bendiokarb (ES 245-216-8)



Nebezpečí

H300 Při požití může způsobit smrt

H330 Při vdechování může způsobit smrt

H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle.

P284 Používejte vybavení pro ochranu dýchacích cest.

P308 + P311 Při expozici nebo podezření na ni: Volejte toxikologické informační středisko nebo lékaře.

P501 Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě.

EUH401 Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.

Vyrábí: Bayer S.A.S., 16 Rue Jean-Marie Leclair, Lyon, Francie

V ČR registruje/dodavatel: Bayer s.r.o., Siemensova 4, 155 00 Praha 5, tel. 266101111

Číslo oznámení: REG-33.7.1-7.9.07/28834

Návod k použití

Působení

Ficam 80 WP se používá proti švábům, rusům cvrčkům, mravencům, rybenkám, mouchám, vosám, kožojedům, rušníkům, štěnicím a dalším druhům škodlivého a obtížného hmyzu v provozovnách potravinářského průmyslu (pekárny, mlékárny, masny), v restauracích, hotelích, nemocnicích, obytných domech, zemědělských provozech apod. Ošetřují se zpravidla pouze pásy nebo lokality výskytu škodlivého hmyzu, především místa při stěnách, lištách, vodovodním a kanalizačním vedení apod. V případě silného zamoření je možno jej použít i k celkovému plošnému postřiku. Účinek se projevuje do několika hodin po zásahu a přetrvává dle podmínek 4 až 6 týdnů. Opakování se provede dle potřeby. Přípravek Ficam není pro hmyz dráždivý, pro vypuzení škůdců z úkrytů a ke zvýšení jejich aktivity je možno ošetření kombinovat s pyrethroidovými přípravky (K-Othrine, AquaPy).

Dávkování

Proti rusům, švábům, mravencům, vosám, kožojedům, štěnicím a rušníkům 30 g přípravku na 10 l vody, proti cvrčkům 15-30 g/10 l vody, proti rybenkám 15 g/10 l vody, proti mouchám 30 g/10 l vody + 100 g cukru/10 l vody.

Přípravek se používá v dávce 1 l suspenze na 25 m² plochy.

Ošetřené plochy nezapáchají a nezůstává na nich viditelný nános.

Při přípravě suspenze se přidá odměřené množství Ficamu 80 WP k požadovanému množství vody v postřikovači a obsah se promísí nebo protřepe. Ficam 80 WP se mísí snadno s vodou a zůstává v suspenzi po celou dobu, pokud je postřikovač používán. Jestliže se však přístroj nechá stát, Ficam 80 WP se pomalu usazuje a jakýkoliv sediment musí být před dalším použitím opět promíchán. Doporučuje se použít Ficam 80 WP v týž den, kdy byl nařazen, zbylý

postřik však není nutné vylít a může být použit i druhý den po novém důkladném promíchání. Za několik dní změni suspenze Ficamu 80 WP barvu z bílé na hnědou a pak by došlo k zabarvení ošetřovaných povrchů. Ficam 80 WP může být aplikován každým postřikovačem, který poskytuje relativně hrubý postřik, který umožňuje zvlhčit povrch bez odrážení drobným kapek.

Bezpečnostní opatření

Při práci s přípravkem používejte ochranný oděv dle ČSN EN ISO 13982-1 (typ 5), izolační dýchač dle ČSN EN 14594 nebo ČSN EN 14593-1 nebo ekvivalent nebo filtrační polomasku proti částicím dle ČSN EN 136P3 nebo ekvivalent, ochranné brýle dle ČSN EN 166, gumové nebo plastové rukavice označené piktogramem proti chemickému nebezpečí podle ČSN EN 420+A1 s uvedeným kódem podle přílohy A k ČSN EN 374, gumové boty. Při práci je zakázáno jíst, pít a kouřit. Před jídlem a po skončení práce je nutno se důkladně umýt teplou vodou a mýdlem. Ucpané trysky nesmí být profukovány ústy. Ochranné prostředky se asanují alkalickými roztoky (např. 3 % roztok sody).

Ficam 80 WP nemůže být použit na zařízení pro přípravu a podávání jídel, na povrchy na nichž se skladují potraviny nebo krmiva, na vnitřky nádob na potraviny. Dojde-li k jejich potřísnění, musí být asanovány 3 % roztokem sody. Nesmí být použit přímo na lidi, zvířata, šaty, ložní prádlo. Dbejte na to, aby při práci nebyly přítomny další osoby. Vstup do ošetřených prostor je možný až po zaschnutí postřiku a vyvětrání.

První pomoc

Při nadýchání: přeneste postiženého na čistý vzduch a udržujte ho v klidu a teple. Vyhledejte lékařskou pomoc.

Při požití: vypláchněte ústa vodou. Udržujte postiženého v klidu a teple. Vyhledejte ihned lékařskou pomoc. Zvracení vyvolejte pouze v případě, že je postižený plně při vědomí, lékařská pomoc není ihned k dispozici, došlo k přijmutí většího množství (více než jedno polknutí) a doba od požití přípravku je kratší než 1 hodina (zvratky se nesmí dostat do dýchacího traktu).

Při zasažení očí - vyplachujte po dobu nejméně 15 min. proudem čisté vody. Po prvních 5 min. vyjměte kontaktní čočky pokud jsou používány (musí se zlikvidovat) a pokračujte ve vyplachování. Vyhledejte lékařské ošetření, pokud podráždění přetrvává.

Při zasažení kůže - slékněte potřísněný oděv a postižené místo omývejte vodou a mýdlem min. 15 minut. Pokud obtíže přetrvávají, vyhledejte lékařskou pomoc.

Léčbu postiženého je možno konzultovat s toxikologickým informačním střediskem v Praze: Klinika nemocí z povolání, Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2, tel: 224 919 293.

Odstraňování obalů a neupotřebitelných zbytků

Použité obaly od přípravku se nesmějí používat k jinému účelu!

Případné nepoužité zbytky přípravku a prázdné obaly (3x vypláchnuté vodou a znehodnocené) se předají oprávněné osobě k odstranění.

Skladování

Přípravek skladujte v suchých, tmavých, uzamykatelných skladech. Uskladnění i transport provádějte odděleně od poživatin, léků, krmiv, dezinfekčních látek a jejich obalů. Přípravek nesmí zmrznout. Při skladování v originálních uzavřených obalech, při teplotě 5 - 30 °C je skladovací doba 3 roky od data výroby. Neskladujte namíchanou jíchou.

Obsah: 500 g

Datum výroby a číslo šarže: uvedeno na obalu