

PESTSTOP® 10 EC

Charakteristika

Insekticidní emulzní koncentrát určený k naředění vodou a k aplikaci ve formě studeného aerosolu nebo postřiku k hubení létajícího hmyzu a k vypuzování a hubení lezoucího hmyzu v uzavřených prostorech. Přípravek je určen k profesionálnímu použití
Biocidní přípravek: insekticid, TP 18

**Účinné látky: tetramethrin 100 g/kg (10 %)
piperonyl butoxid 100g/kg (10 %)**

**Číslo povolení: Oznámeno dle Zákona č.120/2002 Sb.pod zn. 15873/2008-SOZ-33.7.1-6.5.08
Povoleno pro používání v zemědělských a potravinářských provozech pod č. j.: 54/2008 Ústavu pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv Brno**

Upozornění:

Chraňte před dětmi a nepoučenými osobami. Zabraňte kontaktu s očima a kůží
Pro ryby a ostatní vodní živočichy jedovatý. Používejte dle návodu. Při práci s přípravkem nejezte, nepijte a nekuřte. Po práci si umyjte ruce vodou a mýdlem. Nepoužívejte ve volné přírodě. Přípravek neaplikujte na lidi ani na domácí zvířata. Dodržujte návod k použití a doporučené dávkování.

Výstražné symboly:



Varování

Označení rizik:

H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky

Preventivní opatření:

P261 Vyvarujte se vdechování aerosolu.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít
P301 + P310 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
P331 NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
P391 Uniklý produkt seberte
P405 Skladujte uzamčené
P501 Odstraňte obsah/obal jako nebezpečný odpad

Mechanismus účinnosti:

Účinnou látkou tohoto přípravku je syntetický pyretroid tetramethrin, který účinkuje na nervový systém hmyzu a rychle ho usmrcuje při kontaktu s ošetřeným povrchem i ve formě aerosolu. Ukrytý hmyz vypuzuje z jeho úkrytů na postřikem ošetřené plochy v okolí. Piperonyl butoxid účinnost tetramethrinu zesiluje. Přípravek má jen krátkodobou reziduální účinnost.

Návod k použití:

Vypuzování hmyzu z úkrytů: Přípravek Peststop® 10 EC, aplikovaný ve formě studeného aerosolu nebo ULV vypuzuje lezoucí hmyz z jeho úkrytů na povrchy dřívě ošetřené reziduálně působícími postřiky, čímž se zvyšuje jejich účinnost. Vypuzovací účinnosti přípravku může být využito také ke zjišťování zamoření a ke zjišťování účinnosti insekticidních zásahů.

Dávkování: Smíchejte 25 ml přípravku Peststop® 10 EC s 5 litry vody a směs aplikujte vhodnou aplikační technikou vytvářející studený aerosol v množství 1 litr pracovní směsi na každých 100 m³ ošetřeného uzavřeného prostoru. Čím menší jsou aplikované částičky aerosolu, tím vyšší je jeho vypuzovací účinnost. Ošetřený prostor ponechte 1 hodinu uzavřený, pak důkladně vyvětrejte po stejné dlouhou dobu.

Aplikace do úkrytů hmyzu: Smíchejte 50 ml přípravku Peststop® 10 EC s 5 litry vody a aplikujte tlakovým postřikovačem přímo do úkrytů rusů a švábů. Při silném zamoření kombinujte tento způsob aplikaci s aplikací stejného přípravku ve formě studeného aerosolu.

Hubení létajícího hmyzu: Smíchejte 25 ml přípravku Peststop® 10 EC s 5 litry vody a aplikujte ve formě studeného aerosolu v množství 1 litr pracovní směsi na každých 100 m³ ošetřeného uzavřeného prostoru. K hynutí létajícího hmyzu (much, komárů) v prostoru dochází asi za 15 minut. Prostor ponechte uzavřený po dobu 20-30 minut, pak důkladně vyvětrejte po dobu asi 30 minut. Dokonalé uzavření oken, větracích otvorů a vypnutí ventilace během expozice účinnost zvyšuje.

Při aplikaci aerosolu přikryjte oděvy, lůžka a postele, pokud jsou v ošetřovaném prostoru umístěna. Odstraňte všechna domácí zvířata, dobře zakryjte potraviny, nápoje, krmiva a všechno náčiní a předměty, které s potravinami, nápoji, nebo krmivy přicházejí do styku.

Naředený přípravek musí být použit tentýž den.

První pomoc:

Při vděchnutí: Postiženého přemístěte na čerstvý vzduch, uvolněte těsný oděv, udržujte v klidu a teple. Zajistěte lékařské ošetření, pokud potíže přetrvávají.

Při kontaminaci kůže: Odstraňte kontaminovaný oděv, postižené místo kůže omyjte velkým množstvím vody a pak omyjte mýdlem a vodou.

Při zasažení očí: Zasažené oko/oči vyplachujte několik minut velkým množstvím vody, vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno a pokračujte ve vyplachování. Vyhledejte lékaře, pokud jakékoliv potíže přetrvávají.

Při požití: Nevyvolávejte zvracení. Je-li postižený při vědomí, vypláchněte ústa vodou. V případě přetrvávajících potíží vyhledejte lékaře.

Oděv kontaminovaný přípravkem může být vyprán normálním způsobem. Při poskytování první pomoci není ochranný oděv a pomůcky nutný.

V případě potřeby kontaktujte Toxikologické informační středisko, Klinika nemocí z povolání, Na Bojišti 1 128 08 Praha 2 Telefon 24 hod. denně: 224 919 293 nebo 224 915 4

Skladování:

Skladujte v originálních neporušených uzavřených obalech, v suchém, čistém, dobře větratelném a uzavřeném skladu, při teplotě vyšší než + 5°C, odděleně od potravin, léků, krmiv, dezinfekčních prostředků a obalů od těchto látek.

Likvidace obalů a zbytků přípravku:

Přípravkem kontaminované obaly a zbytky přípravku skladujte odděleně a předejte osobě oprávněné odstraňovat nebezpečný odpad.

Doba použitelnosti:

Spotřebujte do 2 roků od data výroby uvedeném na obalu.

Balení: 1 litr

Výrobce: Bábolna Környezetbiológiai Központ Kft., H-1107 Budapest, Szállás u. 6, Maďarsko.

Dovozce a distributor v ČR: SLOM, s.r.o., Staromlýnská 47, 760 01 Zlín – Příluky

Tel./fax: +420 577 218 701, email: slom@slom.cz,

www.slom.cz