

# Rat Killer® Perfekt

10 kg

<b>Použití:</b>	Hotová nástraha určená k hubení potkanů, krys a myší uvnitř a vně objektů. Účinně hubí potkany, krysy a myši již při jednorázovém požití, úhyn nastává po několika dnech (3-5) po požití.
<b>Účinná látka:</b>	Brodifacoum (0,005 g/100 g)
Přípravek obsahuje také <i>denatonium benzoate</i> - hořké činidlo zmiřující riziko nežádoucího požití.	

EUH401 Dodržujte pokyny pro používání, aby jste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí

<b>Držitel rozhodnutí o registraci</b>	ZPUH „BEST PEST“ Małgorzata Świątosławska, Jacek Świątosławski Spółka Jawna ul. Moździerzowców 6 b, 43-602 Jaworzno; Polsko; tel: + 48 (32) 617 75 71; fax: + 48 (32) 615 00 07
<b>Distributor:</b>	MVDr. Daniel Honzák, Velatice 213, Brno-venkov, 664 05, IČ: 66765901; tel: +420 601 362 447
<b>Číslo povolení k uvedení přípravku na trh:</b>	PB/PL/2014/0118/MR
<b>Obsah a druh obalu:</b>	25g, 50g, 100g, 150g, 0,5kg, 1kg, 4kg, 5kg, 10kg, 20kg - nástrahy v papírovém/polyetylenovém sáčku

<b>Datum výroby:</b>	Uvedeno na obalu	<b>Číslo výrobní šarže:</b>	Uvedeno na obalu	<b>Doba použitelnosti:</b>	2 roky od data výroby při předepsaném způsobu skladování
----------------------	------------------	-----------------------------	------------------	----------------------------	--

## Pokyny pro bezpečné zacházení

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.	P280 Používejte ochranné rukavice.
P103 Před použitím si přečtěte údaje na etiketě.	P273 Zabráňte uvolnění do životního prostředí.
P220 Uchovávejte/skladujte odděleně od potravin, nápojů a krmiv.	P 301 + P310 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISTO/lékaře.
P262 Zabraňte styku s kůží.	P404 + P405 Skladujte v uzavřeném obalu. Skladujte uzamčené.
P270 Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.	

**NÁVOD K POUŽITÍ:** Nástrahu pokládejte v doporučeném množství na místa nejčastěji navštěvovaná hlodavci (do děr, nor a skrýší, podél stezek, na suchá a klidná místa). Prostředek lze používat pouze v jedových stanicích, zabezpečených před nežádoucím otevřením. Stanice upevněte k zemi.

**Dávkování:** **likvidace myši:** hromádky o velikosti cca 20g uložených v jedových stanicích v rozmezí 2 m při vysokém stupni zamoření, či 5 m (nízký stupeň zamoření). **Likvidace potkanů a krys:** hromádky o hmotnosti 20-60g v jedových stanicích v rozmezí 5m při vysokém stupni zamoření, či 10 m (nízký stupeň zamoření).

## BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Prostředek se nesmí používat k ochraně rostlin nebo rostlinných produktů. Jedové stanice musí být viditelně označeny informací o tom, že obsahují látku na hubení hlodavců. Jedové stanice by měly být odolné proti neoprávněnému otevření a upevněné k zemi. Kromě toho musí chránit nástrahu před atmosférickými vlivy a znemožňovat přístup necilovým organismům. Nástraha musí být zajištěna proti jejímu odtažení mimo místo aplikace. Přípravek se nesmí používat v místech, kde může dojít ke kontaktu s vodou, povrchem krmiv, potravin nebo kuchyňského náčiní či jejich kontaminací. Staničky s nástrahou pravidelně kontrolujte a sežrané nástrahy doplňujte. Znečištěnou nebo mokrou nástrahu vyměňte. Pokud bude nástraha sežrana beze zbytku, zvýšte počet míst s nástrahou v daném prostoru. Uhynulé hlodavce a zbytky nástrahy likvidujte. Při zacházení s nástrahou jsou nutné rukavice. Před použitím, přečtěte návod na použití a zjistěte intenzitu výskytu hlodavců. Zasažené povrchy umyjte vodou a mýdlem. Zamezte styku s jinými výrobky. Jedové stanice nemohou být dosažitelné pro děti, domácí a ostatní necilová zvířata. Při práci s přípravkem nejezte, nepijte, nekuřte.

## PRVNÍ POMOC

**Při zasažení pokožky:** okamžitě svléknout kontaminovaný oděv a pokožku umýt větším množstvím vody a mýdla. **Při nadýchání:** vyvést postiženého na čerstvý vzduch a nechat jej vklidu (konzultovat s lékařem). **Při zasažení očí:** důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. **Při náhodném požití:** ihned vyhledejte lékařskou pomoc. Důkladně vypláchněte ústa vodou. Po práci a po každém přerušení práce je nutné si omýt teplou vodou a mýdlem ruce a pokožku potenciálně vystavenou přímému styku s nástrahou.

V případě těžké otravy se objevují kráceniny v podkoží, podlitiny, krev v moči či krvavá stolice. **Antidotum:** Vitamin K1, dávku určuje lékař.

Otravu způsobenou biocidními přípravky může ošetřující lékař konzultovat s Toxikologickým informačním střediskem: **Klinika nemocí z povolání, Na Bojišti 1, 128 21 Praha 2, tel: +420 224 919 293; +420 224 915 402**

## SKLADOVÁNÍ

Přípravek skladujte v uzavřených označených a originálních obalech na suchém, chladném a dobře větraném místě. Zabraňte dětem a necilovým organismům (psům, kočkám, prasatům, ptákům a dalším) v přístupu k nástraze. Neskladujte s aromatickými látkami, které by mohly ovlivnit atraktivitu nástrahy. Skladujte odděleně od potravin, nápojů, léků, krmiv, hnojiv, desinfekčních prostředků a jejich obalů. Chraňte před mrazem, vlhkem, ohněm, sáláním tepelných zdrojů a před přímým slunečním zářením.

## Likvidace obalů a nespotebovaných zbytků

Prázdny obaly, veškeré znečištěné nástrahou materiály, případné zbytky přípravku (uzavřené v označené nádobě), a také uhynulá těla hlodavců likvidujte vhodným způsobem a předejte k likvidaci specializované firmě s oprávněním k nakládání s nebezpečnými odpady (např. spalovna). Prostředek nesmí být zneškodňován spolu s komunálním odpadem.