

Ratimor Měkká návnada

Účinný rodenticid proti myším a potkanům, který obsahuje aktivní látku s nejširším spektrem použití a má prokázanou největší účinnost mezi všemi návnadami.

Přednosti:

Velká účinnost kvůli zpožděnému působení

Vhodná jak pro amatérské tak pro profesionální použití

Aktivní látka bromadiolon má nejširší spektrum působení

Je prokázána jako jedna z nejvíce atraktivních návnad na trhu

Rodenticid ve formě měkké návnady

Prokázána nejvíce účinná forma rodenticidů

Účinná jak venku, tak ve vnitřních prostorách, speciálně v chlévech, silech a jiných stavbách, kde je k dispozici hodně potravy

Zvláštní filtrační fólie ještě dodatečně chrání před kontaktem s aktivní látkou

Přidané atraktanty lákají hlodavce

Popis:

Rodenticid ve formě měkké návnady s aktivní látkou bromadiolon je vhodný na hubení domácích myší a černých a šedých potkanů, a především tam, kde se škůdci objevují ve větších populacích. Aktivní látka má vedle zpomaleného působení ještě mimořádně široké spektrum použití, a proto je nejčastější volbou mezi profesionálními deratizéry. Stejně tak mimořádnou úspěšnost zajišťuje atraktant, který vábí škůdce, a samotná forma výrobku – měkké návnady jsou prokazatelně nejúčinnější formou rodenticidů.

Jsou mimořádně vhodné na používání v prostorách, kde mají myši a potkani k dispozici hodně potravy. Působit začne ihned, když je zvíře požije, ale uhynie ještě později, takže nezpůsobí odpor vůči návnadě u živých hlodavců. Zvláštní filtrační fólie umožňuje jednoduché a dávkované zacházení s návnadou, a současně zabraňuje přístupu vlhkosti a umožňuje dlouhodobější působení návnady. Bromadiolon zabraňuje tvorbu protrombinu v krvi, což způsobí vnitřní a vnější krvácení a úhyn hlodavce. Ratimor měkká návnada začne působit brzy po požití. Smrt jednotlivých členů nezpůsobí odpor vůči návnadě u živých hlodavců. Myši a potkani, kteří se otráví, třebaže s jednou samotnou dávkou mají pocit dušení a spěchají k otevřenému prostoru. Ratimor měkká návnada je účinná také proti hlodavcům, kteří jsou odolní na varfarin a další antikoagulanty první generace. Akce deratizace s Ratimor měkkou návnadou trvá od 7 do 10 dní.

Návod na použití:

Ratimor měkká návnada je balena v menších porézních sáčkích, které se neotvírají. Návnady umístíme na místech, kde se pohybují myši a potkani, a také se zdržují lidi a jiná zvířata, zakryjeme starými deskami, nebo starými cihlami. Ratimor měkkou návnadu používáme jako rodenticid ve skladech zemědělských výroben, ve skladech potravin, nebo na zemědělských farmách, a to na hubení myší a potkanů:

pro domácí myši (*Mus musculus*) v množství 20–25 g, resp. 2–3 návnady s umístěním v hromádkách v blízkosti hnízda, nebo na místa, kde se pohybují

pro černé potkany (*Rattus rattus*) a šedivé potkany (*Rattus norvegicus*) v množství od 100- 150 g, resp. 10-15 návnad s umístěním v hromádkách na zakrytých místech.

Spotřebovanou návnadu je nutno nahrazovat, dokud nebudou myši a potkani zcela vyhubeni. Uhynulá zvířata odstraníme. V místech, kde se zdržují osoby, nebo zvířata návnady zakryjeme starými deskami, nebo cihlami. Při umístění návnad je nutno dávat pozor, aby nedošlo ke znečištění vody (umístujeme minimálně 20 m od vody). Návnady nesmí být přístupné dětem a teplokrevným zvířatům.

Návnady uchovávejte v uzavřeném prostoru, který není určen na skladování potravin, nápojů a krmiva pro zvířata. Uchovávejte je v originálním balení a nepřístupné dětem. Chraňte je před teplotou, světlem a vlhkostí.

Uživatel musí odevzdat prázdný obal, zbytky nepoužitého prostředku, nebo prostředku, kterému vypršela lhůta použitelnosti příslušnému sběrnému dvoru, nebo odstraňovači nebezpečných odpadů. Musí se zacházet v souladu s předpisy o životním prostředí, které upravují oblast zacházení s nebezpečnými odpady a zacházení s obaly a odpadními obaly.

KVŮLI OCHRANĚ ZDRAVÍ LIDÍ A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ DODRŽUJTE NÁVODY NA POUŽITÍ, KTERÉ JSOU PŘILOŽENY K VÝROBKU A NA SAMOTNÉM BEZPEČNOSTNÍM LISTU.