

Mravenci: (hubení hnízd):

Mravenci sbírají mikrokapsule a odnášejí je do mravenišť, kde seaz odcházejí. Nevdechujte mlhu/páry/aerosoly. Při aplikaci použijte ochranné oblečení. Pokud podmínky nejsou příjatečné, ukryjte mravenišť a pás o šířce 10 cm navlečený kolem mravenišť a pás o šířce 10 cm navlečený kolem mravenišť. Použitím tohoto přípravku uživatel nebo pracovník nemusí být ochranně ošetřeni zmlžováním se doporučuje použití ochranných pomůcek.

Při přípravě aplikace kapaliny používejte vhodné rukavice, pracovní oblečení a ochranné pomůcky. Při aplikaci použijte ochranné oblečení. Pokud podmínky nejsou příjatečné, ukryjte mravenišť a pás o šířce 10 cm navlečený kolem mravenišť a pás o šířce 10 cm navlečený kolem mravenišť. Použitím tohoto přípravku uživatel nebo pracovník nemusí být ochranně ošetřeni zmlžováním se doporučuje použití ochranných pomůcek.

Před použitím tohoto výrobku si přečtěte celý návod k použití, podmínky použití a omezení odpovědnosti. Pokud podmínky nejsou příjatečné, ukryjte mravenišť a pás o šířce 10 cm navlečený kolem mravenišť a pás o šířce 10 cm navlečený kolem mravenišť. Použitím tohoto přípravku uživatel nebo pracovník nemusí být ochranně ošetřeni zmlžováním se doporučuje použití ochranných pomůcek.

Zemědelské objekty, stáje, kůlny, farmy prasat, dobytka, koní, kuřat, hospodářských zvířat, zemědělské stavby a mlékárny.

PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ
POUZE PRO POUŽITÍ JAKO INSEKTICID (biocid - typ 18)

Podmínky:
Návod k použití tohoto přípravku je považován za příjatečný a musí být dodržován. Nicméně, není možné eliminovat veškerá rizika spojená s tímto produktem. Mohou nastat škody, nežádoucí účinky nebo jiné než předpokládané účinky.

Ošetření lze provádět za přítomnosti zvířat. Neaplikujte přímo na zvířata. Aplikaci provádějte za suchých povrchů. Před aplikací připravte jemnou mlhu s nízkým tlakem; povrchy ošetřete dříve, než začnete s aplikací. Zvláštní pozornost věnujte prasklinám, škvírám a místům, kde se hmyz ukrývá.

PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ
POUZE PRO POUŽITÍ JAKO INSEKTICID (biocid - typ 18)
Před aplikací připravte jemnou mlhu s nízkým tlakem; povrchy ošetřete dříve, než začnete s aplikací. Zvláštní pozornost věnujte prasklinám, škvírám a místům, kde se hmyz ukrývá.

Návod k použití tohoto přípravku je považován za příjatečný a musí být dodržován. Nicméně, není možné eliminovat veškerá rizika spojená s tímto produktem. Mohou nastat škody, nežádoucí účinky nebo jiné než předpokládané účinky.

BOMBEX® FARUMY®		Voda*	Ošetřený prostor
Studené zmlžování	100 ml	5 l	500 m³
Horké zmlžování	100 ml	-	500 m³

Vnitřní prostorové ošetření – studené a horké zmlžování
dýchacích orgánů a ochranou očí.

Podmínky:
Návod k použití tohoto přípravku je považován za příjatečný a musí být dodržován. Nicméně, není možné eliminovat veškerá rizika spojená s tímto produktem. Mohou nastat škody, nežádoucí účinky nebo jiné než předpokládané účinky.

* Skutečný objem potrubné vody se může lišit v závislosti na podmínkách aplikace a aplikací.

Podmínky:
Návod k použití tohoto přípravku je považován za příjatečný a musí být dodržován. Nicméně, není možné eliminovat veškerá rizika spojená s tímto produktem. Mohou nastat škody, nežádoucí účinky nebo jiné než předpokládané účinky.

Podmínky:
Návod k použití tohoto přípravku je považován za příjatečný a musí být dodržován. Nicméně, není možné eliminovat veškerá rizika spojená s tímto produktem. Mohou nastat škody, nežádoucí účinky nebo jiné než předpokládané účinky.

Aplikaci provádějte za řízením pro generování horkého aerosolu, ULV generátorem pro aplikaci studeného aerosolu, rotačním atomizérem s podporou vrtu, nebo ručním zádovkovým postřikovačem určeným pro prostorovou aplikaci. Rozprašujte do vzduchu kolem oblastí určených k ošetření, při čemž zvláštní pozornost věnujte místům, kde hmyz odpovídá nebo se ukrývá.

Aplikaci provádějte za řízením pro generování horkého aerosolu, ULV generátorem pro aplikaci studeného aerosolu, rotačním atomizérem s podporou vrtu, nebo ručním zádovkovým postřikovačem určeným pro prostorovou aplikaci. Rozprašujte do vzduchu kolem oblastí určených k ošetření, při čemž zvláštní pozornost věnujte místům, kde hmyz odpovídá nebo se ukrývá.

Aplikaci provádějte za řízením pro generování horkého aerosolu, ULV generátorem pro aplikaci studeného aerosolu, rotačním atomizérem s podporou vrtu, nebo ručním zádovkovým postřikovačem určeným pro prostorovou aplikaci. Rozprašujte do vzduchu kolem oblastí určených k ošetření, při čemž zvláštní pozornost věnujte místům, kde hmyz odpovídá nebo se ukrývá.

Před aplikací zavěste okna a dveře a ponechte uzavřené alespoň po dobu 1 hodiny. Vypněte elektrická zařízení a klimatizaci. Během aplikace zabráňte vstupu jiných osob a zvířat. Aplikaci provádějte v době, kdy je hmyz nejvíce aktivní. Po aplikaci vyvětrejte ošetřený prostor po dobu nejméně 4 hodin nebo za pomoci odsávání k odvětrání místnosti (průtok 1200 m³/h). Před vstupem do ošetřených prostor byste měli být informováni o centru. Nikdy nepodávejte nic ústí osob v bezvědomí. Vyvážte zvracení.

Před aplikací zavěste okna a dveře a ponechte uzavřené alespoň po dobu 1 hodiny. Vypněte elektrická zařízení a klimatizaci. Během aplikace zabráňte vstupu jiných osob a zvířat. Aplikaci provádějte v době, kdy je hmyz nejvíce aktivní. Po aplikaci vyvětrejte ošetřený prostor po dobu nejméně 4 hodin nebo za pomoci odsávání k odvětrání místnosti (průtok 1200 m³/h). Před vstupem do ošetřených prostor byste měli být informováni o centru. Nikdy nepodávejte nic ústí osob v bezvědomí. Vyvážte zvracení.

Před aplikací zavěste okna a dveře a ponechte uzavřené alespoň po dobu 1 hodiny. Vypněte elektrická zařízení a klimatizaci. Během aplikace zabráňte vstupu jiných osob a zvířat. Aplikaci provádějte v době, kdy je hmyz nejvíce aktivní. Po aplikaci vyvětrejte ošetřený prostor po dobu nejméně 4 hodin nebo za pomoci odsávání k odvětrání místnosti (průtok 1200 m³/h). Před vstupem do ošetřených prostor byste měli být informováni o centru. Nikdy nepodávejte nic ústí osob v bezvědomí. Vyvážte zvracení.

Mravce (zni enie mraveniska):

Mravce mikrokapsuly zbierajú a odnášajú ich do mraveniska, kde sa ich snažia nevdychujú. V opa nom prípade používajte dýchaciu masku. Pred použitím si pre itajte celý návod na použitie, za nú uvo ova ú innú látku na ni enie mravcov, kukiel, krá sa ošetrených vetraním na ochranu celej tváre a ochranu o í. Pri opätom nstavení odporú ame ochranu dýchacích ciest. Ošetríte plochu 1m² okolo vstupu do mraveniska a 10cm okolo otvoru. Ošetríte plochu 1m² okolo vstupu do mraveniska a 10cm okolo otvoru. Ošetríte plochu 1m² okolo vstupu do mraveniska a 10cm okolo otvoru.

Pri riedení používajte vhodné rukavice, kombinézy, izmy a ochranu očí. Pred použitím si pre itajte celý návod na použitie, za nú uvo ova ú innú látku na ni enie mravcov, kukiel, krá sa ošetrených vetraním na ochranu celej tváre a ochranu o í. Pri opätom nstavení odporú ame ochranu dýchacích ciest.

Príprava: Pred použitím si pre itajte celý návod na použitie, za nú uvo ova ú innú látku na ni enie mravcov, kukiel, krá sa ošetrených vetraním na ochranu celej tváre a ochranu o í. Pri opätom nstavení odporú ame ochranu dýchacích ciest. Ošetríte plochu 1m² okolo vstupu do mraveniska a 10cm okolo otvoru. Ošetríte plochu 1m² okolo vstupu do mraveniska a 10cm okolo otvoru. Ošetríte plochu 1m² okolo vstupu do mraveniska a 10cm okolo otvoru.

UPOZORNENIA

Na ošetrovanie len vo forme insekticídu (typ produktu 18). Na ošetrovanie len vo forme insekticídu (typ produktu 18). Na ošetrovanie len vo forme insekticídu (typ produktu 18). Na ošetrovanie len vo forme insekticídu (typ produktu 18). Na ošetrovanie len vo forme insekticídu (typ produktu 18).

Príprava: Pred použitím si pre itajte celý návod na použitie, za nú uvo ova ú innú látku na ni enie mravcov, kukiel, krá sa ošetrených vetraním na ochranu celej tváre a ochranu o í. Pri opätom nstavení odporú ame ochranu dýchacích ciest.

Príprava: Pred použitím si pre itajte celý návod na použitie, za nú uvo ova ú innú látku na ni enie mravcov, kukiel, krá sa ošetrených vetraním na ochranu celej tváre a ochranu o í. Pri opätom nstavení odporú ame ochranu dýchacích ciest.

Table with 3 columns: Ošetrenie vnútorných priestorov – teplé a studené zahmlievanie, BOMBEX® FARUMY® Voda*, Ošetrený priestor. Rows: Zahmlievanie za studena (100 ml / 500 m³), Zahmlievanie za tepla (100 ml / 500 m³).

* Potrebné množstvo vody sa môže líši v závislosti od stavu povrchu a aplikátora.

Nanášajte pomocou tepelného zariadenia na zahmlievanie, zariadenia na studené zahmlievanie, zariadenia na studené zahmlievanie, zariadenia na studené zahmlievanie, zariadenia na studené zahmlievanie.

Pred aplikáciou zavrite okná a dvere a nechajte ich zavreté aspo 1 hodinu. Vypnite elektrinu a klimatizáciu. Pri aplikácii prípravku zabrá te prístupu zvierat a osôb. Aplikáciu prispôbte dobe, kedy je cie ový hmyz najaktívnejší. Po nanosení ošetrovaných priestorov vetrajte najmenej 4 hodiny alebo na vyvetranie miestnosti použite vzduchový odsáva (rýchlos 1200 m³/h). Pred vstupom do ošetrovaného priestoru by mal by postrek úplne vyschnutý.

Poznámka pre lekára: Komplexné lekárske rady na lie bu otráv vám poskytne najbližšie informácie. Osobe v bezvedomí nikdy nepodávajte lekárske lieky. Nevyvolávajte zvracanie.

Príprava: Pred použitím si pre itajte celý návod na použitie, za nú uvo ova ú innú látku na ni enie mravcov, kukiel, krá sa ošetrených vetraním na ochranu celej tváre a ochranu o í. Pri opätom nstavení odporú ame ochranu dýchacích ciest.

Príprava: Pred použitím si pre itajte celý návod na použitie, za nú uvo ova ú innú látku na ni enie mravcov, kukiel, krá sa ošetrených vetraním na ochranu celej tváre a ochranu o í. Pri opätom nstavení odporú ame ochranu dýchacích ciest.